Αριστείδης Ν. Μάντακας , MD, MRCOG, CCT (UK)
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος - Ενδοσκοπικός Χειρουργός

Φανερωμένης 5 & Αγαμέμνονος 13 - Χολαργός - 15561
: 215- 5208452
: iatreio@drmantakas.gr
: www.gynae4u.gr - www.drmantakas.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΥΣΤΕΡΟΣΑΛΠΙΓΓΟΓΡΑΦΙΑ

Η υστεροσαλπιγγογραφία παραμένει η "χρυσή" εξέταση στη διερεύνηση της γυναικείας υπογονιμότητας. Ποιές είναι, όμως, οι διαδικασίες που απαιτούνται για να γίνει με τον πλέον αποτελεσματικό και ανώδυνο για τη γυναίκα τρόπο;

Με τη χρήση ακτινών Χ και την έγχυση σκιαγραφικής αντίθεσης απεικονίζεται άριστα τόσο η μητρική κοιλότητα όσο και οι σάλπιγγες. Με την εξέταση της υστεροσαλπιγγογραφίας αναδεικνύεται η φυσιολογική βατότητα των ωαγωγών (σαλπίγγων) και ο ο βαθμός επικοινωνίας τους με την περιτοναϊκή κοιλότητα, δίνοντας τις περισσότερες φορές άμεσες και ουσιαστικές απαντήσεις για τα αίτια της γυναικείας στειρότητας.

Οι προϋποθέσεις για την ασφαλή διενέργεια της εξέτασης είναι:

- Η εξέταση να διενεργείται από την 7η μέχρι την 11η ημέρα του κύκλου.
- Σε περιπτώσεις διερεύνησης ανεπάρκειας τραχήλου η εξέταση διενεργείται από τη 18η ως την 22η ημέρα.
- Πλήρης αποχή με ελεύθερη επαφή από την αρχή της περιόδου μέχρι την ημέρα της εξέτασης, καθώς η παραμικρή πιθανότητα εγκυμοσύνης, σε συνδυασμό με τη χρήση των ακτίνων Χ, οδηγεί σε υποχρεωτική διακοπή της.

* Τυχόν αλλεργία ή θυρεοειδοπάθεια πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρονται πριν από την εξέταση.

Η προετοιμασία

Μία ώρα πριν από την εξέταση πρέπει να λαμβάνεται αναλγητικό ή μυοχαλαρωτικό φάρμακο, σε συνεννόηση με τον θεράποντα ιατρό.

Η χορήγηση αντιβίωσης κρίνεται απαραίτητη για προληπτικούς λόγους.

Η εξεταζόμενη τοποθετείται σε γυναικολογική θέση στο ακτινολογικό τραπέζι. Με τη βοήθεια κολποδιαστολέα εφαρμόζεται στον τράχηλο ειδικός καθετήρας μέσω του οποίου γίνεται η έγχυση της ουσίας σκιαγραφικής αντίθεσης υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο.

Αφού ληφθούν ορισμένες ακτινολογικές λήψεις, η εξέταση έχει ολοκληρωθεί

Η εξέταση

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης ενδεχομένως να παρουσιαστεί κάποια ήπια ενόχληση ή πόνος ανάλογος με αυτόν του πόνου της περιόδου, που οφείλεται σε κολικό λόγω διάτασης της μήτρας και στον ερεθισμό του περιτοναίου με τη διάχυση του σκιαγραφικού εντός αυτού. Η παρουσία της είναι παροδική και, σε αντίθετη περίπτωση, αντιμετωπίζεται με ήπια αναλγητικά.

Μετά το πέρας της διαδικασίας η εξεταζόμενη είναι σε καλή κατάσταση και μπορεί να αποχωρήσει. Μερικές φορές αναφέρεται ζαλάδα ή κάποιες κράμπες για μία - δύο ημέρες μετά την εξέταση, όπως και ελαφρά κολπική αιμορραγία.

Είναι σπάνιες οι περιπτώσεις όπου αναφέρεται αλλεργική αντίδραση στη χρήση της σκιαγραφικής ουσίας.

Ο ιατρός ακτινοδιαγνώστης ενημερώνει άμεσα την εξεταζόμενη για τα αποτελέσματα της υστεροσαλπιγγογραφίας για να προχωρήσει με τον θεράποντα ιατρό της στην αντιμετώπιση και θεραπεία των προβλημάτων που ενδεχομένως έχουν διαγνωστεί.